



NATRIA[®]

Insect, Disease & Mite Control

Ready-to-Use

Controls Black Spot, Powdery Mildew,
Rust, Aphids & Mites



Active Ingredients:
Sulfur 0.20%
Pyrethrins 0.01%
Other Ingredients 99.79%
Total 100.00%

50146026a 170427M

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See inside panels for additional
precautionary statements

NET CONTENTS
24 FL OZ (709ml)

NOTA PARA EL COMPRADOR: En la medida en que cumpla con la ley vigente, el vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química que figura en la etiqueta y que se ajusta razonablemente a los propósitos establecidos en esta etiqueta sólo cuando se usa siguiendo las indicaciones bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no se extiende al uso de este producto en forma contraria a las indicaciones de la etiqueta, o bajo condiciones anormales de uso, o bajo condiciones razonablemente imprevisibles por el vendedor. En la medida en que cumpla con la ley vigente, el vendedor no extiende ninguna otra garantía, expresa o implícita.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.




Insect, Disease & Mite Control Ready-to-Use

This product controls a wide range of fungal diseases and pests. For use on roses, flowers, houseplants, ornamental trees and shrubs, fruits, nuts, and vegetables. Contact killer for both insect and mite pests. Convenient and Easy-to-use.

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Controls Insects, Fungal Diseases and Mites Including Spider Mites
- For Use on Plants – Indoors & Outdoors
- Use Up to Day Before Harvest

KILLS	Ants (excluding Fire Ants, Harvester Ants, Pharaoh's Ants and Carpenter Ants), Aphids, Mites, Spider Mites, Leafhoppers, Caterpillars, Rose Slugs, Whiteflies, Spittlebugs, Mealybugs, Scale, Thrips, Psyllids, Plant Bugs, Lace Bugs, Fruit Flies, and Earwigs.
FUNGAL DISEASES CONTROLLED	Blackspot, powdery mildew, rust, scab, blight, brown rot, and leaf spot.
WHERE TO USE	On roses, flowers, listed fruit and nut trees, vegetables, vine plants, ornamentals and lawns.
WHEN TO USE	When insects, insect damage, or fungal disease first appears.
	For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724.




FOR USE ONLY ON RESIDENTIAL LAWNS AND GARDENS.

ACTIVE INGREDIENTS:
 Sulfur 0.20%
 Pyrethrins 0.01%
OTHER INGREDIENTS 99.79%
TOTAL 100.00%

501422806a 170427V1



EPA Reg. No. 67702-15-92564
 EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
 (47) = 52251-OR-005 (65) = 92564-TX-1
 (57) = 071106-GA-003



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

BEFORE YOU USE

USE PRECAUTIONS

- Some varieties of grapes and cucurbits are sensitive to sulfur and some plant damage may occur.
- Use care or do not spray on sulfur sensitive plants. If not sure, test spray a few leaves 2 days before spraying the entire plant.

USE RESTRICTIONS

- Do not apply to strawberry fruit that will be used for canning.
- Do not wet plants to point of runoff or drip.
- Do not water the treated areas to point of runoff or drip.
- Do not make applications during rain.
- Not for use in outdoor residential misting systems.
- Do not apply more than 10 times per season.
- Do not reapply within 3 days except under extreme pest pressure.
- In case of extreme pest pressure do not reapply within 24 hours.
- Do not apply more than 1 time per day.
- Do not apply more than 18.5 fl. oz. per 100 square feet per application.
- Do not use if temperatures are expected to be over 90°F.
- Do not apply this product in a way that will contact adults, children or pets, either directly or through drift.
- Remove pets, birds, and cover aquariums before spraying.
- Remove or cover exposed food and drinking water before application. Remove or cover dishes, utensils, food processing equipment, and food preparation surfaces, or wash them before use.
- Do not apply directly to or near water, storm drains, or drainage ditches. Do not apply when windy. To prevent product runoff, do not over water treated area(s) or apply prior to heavy rainfall.
- Do not apply directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to storm sewers, water bodies, or aquatic habitat can occur.
Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not allow adults, children or pets to enter the treated area until sprays have dried.
- Do not spray plants with this product within 21 days of an oil spray.

HOW TO USE **Shake Well Before Using. Do Not Dilute.**

FOR CONTROL OF FUNGAL DISEASES

Controls a wide range of fungal diseases including: blackspot, powdery mildew, rust, scab, blight, brown rot, and leaf spot. Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots. For best control apply as a protective spray early in the season before the diseases are noticed. Re-spray every 7 to 10 days or after rain. May be used up to day before harvest. (cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

HOW TO USE (cont'd)

FOR CONTROL OF INSECTS/MITES

Controls a wide range of pests including: Ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), Aphids (including Green Peach Aphids), Armyworms, Bagworms, Beet Armyworm, Beetles (including Asparagus Beetle, Bean Beetles, Blister Beetles, Colorado Potato Beetles, 12-spotted Cucumber Beetles, Cucumber Beetles, Darkling Beetles (lesser mealworm), Saw-toothed Grain Beetles, Elm Leaf Beetles, Flea Beetles, Japanese Beetles, Mexican and Bean Beetles), Blow Flies, Borers (including European Corn Borer, and Squash Vine Borer), Cabbage Looper, Cabbageworms (including Cross-striped Cabbageworm and Imported Cabbageworm), Cankerworms, Caterpillars (including Eastern Tent Caterpillar, Forest Caterpillar and Tent Caterpillar), Crane Flies, Crickets, Diamondback Moth Larvae, Earwigs, Fireworms, Fungus Gnats, Fruit Flies, Glassy Winged Sharpshooter, Grape Leaf Skeletonizer, Green Fruit Worm, Harlequin Bug, Hornworms including Tomato Hornworm, Katydid, Lace Bugs, Leafhoppers (including Grape Leafhopper, and Potato Leafhoppers), Leafminers, Leaf-tiers, Loopers, Leafrollers (including Fruittree Leafrollers), Lygus, Maggots (including Apple Maggot and Onion Maggot), Mealy Bugs, Midges, Millipedes, Mites (including Spider Mites and Clover Mite), Moths (including Artichoke Plume Moth, Codling Moth, Diamondback Moth, European Pine Tip Moth, Gypsy Moth (adults and larvae), Indian Meal Moth and Mediterranean Flour Moth), Mushroom Flies, Navel Orangeworm, Pear Psylla, Plant Bugs, Psyllids, Roselugs, Scale, Silverfish, Skippers, Sowbugs, Spittlebugs, Squash Bugs, Stink Bugs, Tarnished Plant Bug, Thrips including Greenhouse Thrips, Vinegar Flies, Webworms, Weevils (including Boll Weevil, Carrot Weevil, Clover Weevil and Rice Weevil), Whiteflies.


Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots and underside of leaves. Pests need to be contacted by the spray to be controlled.

For use only on residential lawns and gardens. Not for use on agricultural establishments growing agricultural crops or commodities for resale.

USE SITE - INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST	DISEASE
FRUIT AND NUT TREES: Almond, apple, cherry, citrus, filbert, nectarine, peach, pear, plum, prune, walnut	ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), aphids, apple maggot, beetles, mites, moths, spider mites, leafhoppers, leafrollers, leafminers, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, earwigs	scab, powdery mildew, rust, blight, brown rot

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)		
USE SITE – INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST	DISEASE
VEGETABLE AND VINE PLANTS: beans, beets, blackberries, blueberries, broccoli, brussel sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, corn, cucurbits, (cucumber, melons, pumpkins and squash), currant, gooseberries, grapes, kale, onions, peas, peppers, potatoes, raspberries, strawberries, tomatoes	ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), armyworms, beetles, cabbageworms, squash vine borer, armyworms, aphids, mites, spider mites, leafhoppers, leafrollers, leafminers, loopers, onion maggots, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, earwigs, weevils	powdery mildew, rust, blight, leaf spots
ORNAMENTALS: flowering plants and shrubs, woody ornamentals, roses, trees and houseplants	ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), aphids, beetles, mites, spider mites, leafhoppers, leafrollers, leafminers, armyworms, loopers, caterpillars, roseslugs, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, lacebugs, earwigs, weevils	powdery mildew, rust, blight, black spot, leaf spots
LAWNS	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, beetles, spittlebugs, thrips, earwigs	rust, leaf spot, blight, powdery mildew

STORAGE AND DISPOSAL
PESTICIDE STORAGE
Store at room temperature and protect from freezing.
PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING 
Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. If Empty: • Place in trash or offer for recycling if available. If Partly Filled: • Call your local solid waste agency or call 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.
PRECAUTIONARY STATEMENTS
ENVIRONMENTAL HAZARDS
This product is toxic to aquatic organisms including fish and invertebrates. Do not contaminate water when disposing of equipment, washwater, or rinsate. Do not apply directly to or near water. Drift and run-off may be hazardous to fish in water adjacent to treated areas. See Directions for Use for additional precautions and requirements.
PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS
Combustible. Do not use or store near heat or open flame.
User Safety Recommendations • Users should wash hands with plenty of soap and water before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. • Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Controla insectos, enfermedades fúngicas y ácaros, incluyendo arañas rojas.
- Puede usarse en plantas: interior y exterior.
- Se usa hasta el día antes de la cosecha

MATA	Hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas cosechadoras, hormigas faraón y hormigas carpinteras), áfidos, ácaros, arañas rojas, chicharritas de la hoja, babosas de la rosa, moscas blancas, salivazos, chinches harinosas, escalas, trips, psílidos, chinches de plantas, chinches de encaje, moscas de las frutas y tijeretas.
ENFERMEDADES FÚNGICAS CONTROLADAS	Antracnosis, mildiú polvoroso, roya, roña, fuego bacteriano, podredumbre parda, y manchas foliares.
DÓNDE USAR	En rosas, flores, frutos del listado y frutos secos, vegetales, plantas de vid, plantas ornamentales y céspedes.
CUÁNDO USAR	Cuando los insectos, o el daño producido por ellos, o una enfermedad fúngica aparezca primero.
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Azufre	0,20%
Piretrinas	0,01%
OTROS INGREDIENTES	99,79%
TOTAL	100,00%

**PARA USAR EN
CÉSPEDES
Y JARDINES
DOMICILIARIOS
ÚNICAMENTE.**

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

ANTES DE USAR

PRECAUCIONES DE USO

- Algunas variedades de uvas y cucurbitáceas son sensibles al azufre, el que puede causar algún daño en las plantas.
- Tenga cuidado o evite rociar el producto sobre plantas sensibles al azufre. Si no está seguro, rocíe pocas hojas 2 días antes de rociar toda la planta.

RESTRICCIONES DE USO

- No aplique sobre frutillas que serán enlatadas.
- No riegue las plantas hasta el punto de escurrimiento o goteo.
- No riegue las áreas tratadas hasta el punto de escurrimiento o goteo.
- No aplicar cuando llueve.
- No usar en sistemas externos de humidificación residencial.
- No aplicar más de 10 veces por temporada.
- No volver a aplicar dentro de los 3 días, salvo en presencia extrema de plagas.
- En presencia extrema de plagas, no volver a aplicar dentro de las 24 horas.
- No aplicar más de 1 vez por día.
- No aplicar más de 18,5 onzas líquidas cada 100 pies cuadrados por aplicación.
- No usar si se esperan temperaturas superiores a 90° F
- No aplicar este producto de forma en que esté en contacto con adultos, niños o mascotas, ya sea en forma directa o por el viento.
- Saque las mascotas, los pájaros y acuarios cubiertos antes del rociado.
- Saque o cubra alimentos expuestos y agua potable antes de la aplicación.
- Saque o cubra platos, utensilios, procesadores de alimentos, y superficies donde se preparan comida, o lávelos antes de usar.
- No aplique directamente al agua o en sus cercanías, alcantarillas, o zanjas de desagüe.
- No aplique cuando hay viento. Para evitar el escurrimiento del producto, no riegue en abundancia el (las) área(s) tratada(s) o aplique antes de intensas lluvias.
- No aplique directamente en desagües y cañerías, o en cualquier área como alcantarillas donde haya canales de desagüe a cloacas, bocas de tormenta, masas de agua, o hábitat acuático. Evite que el producto se escurra en una cañería durante o después de la aplicación
- No permita que adultos, niños o mascotas ingresen al área tratada hasta que el rociado se haya secado.
- No rocíe las plantas con este producto durante 21 días si las ha rociado con un aceite.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)**CÓMO USAR****PARA CONTROL DE ENFERMEDADES FÚNGICAS**

Controla una gran variedad de enfermedades fúngicas incluyendo antracnosis, mildiú polvoroso, roña, roya, fuego bacteriano, podredumbre parda y manchas foliares. Rocíe todas las partes de la planta, especialmente los nuevos brotes. Para un mejor control aplique este producto como un rociado protector a principios de la temporada antes de que aparezcan las enfermedades. Vuelva a rociar después de 7 a 10 días o después de la lluvia. Puede usarse hasta el día anterior a la cosecha.

PARA CONTROL DE INSECTOS/ÁCAROS

Controla una gran variedad de plagas incluyendo: hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas cosechadoras, hormigas faraón y hormigas carpinteras), áfidos (incluyendo áfidos verdes del duraznero), gusanos soldados, gusanos del saco, gusanos de la remolacha, escarabajos (incluyendo escarabajos del espárrago, escarabajos del frijol, escarabajos ampolleros, escarabajos de la papa de Colorado, escarabajo manchado del pepino, escarabajos del pepino, escarabajo de la harina (tenebrio molitor), carmoma dentado de los granos, escarabajos de la hoja del olmo, escarabajos pulga, escarabajos japoneses, escarabajos mexicanos y del frijol), moscardones, barrenadores (incluyendo barrenadores del maíz europeo, y barrenadores de la calabaza), gusanos medidores del repollo, gusanos del repollo (incluyendo gusanos del repollo con rayas cruzadas y gusanos del repollo importado), gusano de los brotes, orugas (incluyendo orugas carpas orientales, orugas del bosque, orugas carpa), tipula europea, grillos, larvas de la polilla de la col, tijeretas, gusanos de fuego, mosquitas de los hongos, moscas de los frutos, cigarrillas de alas cristalinas, oruga de la parra, gusanos verde de frutas, chinches arlequín, gusanos cornudos incluyendo gusanos cornudos del tomate, cigarras de la gobernadora, chinches de encaje, chicharritas de la hoja (incluyendo chicharritas de la hoja de la parra y chicharritas de la hoja de la papa) minadores de la hoja, tortrix, gusanos medidores, rosquilla omnívora (incluyendo el gusano de la manzana y el gusano de la cebolla), chinches harinosas, jejenes, ciempiés, ácaros (incluyendo arañas rojas y ácaros del trébol), polillas (incluyendo polillas de la alcachofa, polillas de la manzana) polillas de la col, polillas europeas del brote del pino, polillas gitanas (adultos y larvas), polillas indias y polillas mediterráneas de la harina), moscas de los hongos, gusanos naranja, psila del peral, chinches de las plantas, psílidos, babosas de la rosa, escamas, lepismas, mariposas saltarinas, cochinillas, salivazos, chinches de la calabaza, chinches hediondas, chinches manchadas de las plantas, trips incluyendo trips de la platanera, moscas del vinagre, gusanos tejedores, gorgojos (incluyendo gorgojos de cápsula, gorgojos de la zanahoria, gorgojos del trébol y gorgojos del arroz), moscas blancas.

Rocíe todas las partes de la planta, especialmente los nuevos brotes, y la parte inferior de las hojas. Las plagas deben entrar en contacto con el rociado para ser controladas.

Para uso exclusivo en céspedes y jardines hogareños. No usar en establecimientos agrícolas que produzcan cosechas agrícolas o productos para la reventa.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)**USAR EN INTERIORES, AL AIRE LIBRE Y EN INVERNADEROS**

FRUTAS Y ÁRBOLES DE FRUTOS SECOS: almendras, manzanas, cerezas, cítricos, avellanas, nectarinas, duraznos, peras, ciruelas, pasas, nueces.

PLAGA

hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas cosechadoras, hormigas faraón y hormigas carpinteras), áfidos, gusanos de la manzana, escarabajos, ácaros, polillas, arañas rojas, chicharritas de la hoja, rosquillas omnívoras, minadores de la hoja, orugas, moscas blancas, salivazos, chinches harinosas, escamas, trips, psílidos, chinches de la planta, moscas de las frutas, tijeretas

ENFERMEDAD

roña, mildiú polvoroso, roya, fuego bacteriano, podredumbre parda.

VEGETALES Y PLÁNTAS DE LA VID: porotos, remolachas, moras, arándanos brócoli, repollitos de Bruselas, repollos, zanahorias, coliflores, maíz, cucurbitáceas (pepinos, melones, zapallos, calabazas), pasas de uva, kiwis, uvas, coles rizados, cebollas, arvejas, pimientos, papas, frambuesas, frutillas, tomates.

hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas cosechadoras, hormigas faraón y hormigas carpinteras), gusanos soldados, escarabajos, gusanos del repollo, barrenadores de la calabaza, gusanos soldados, áfidos, ácaros, arañas rojas, chicharritas de la hoja, rosquillas omnívora, minadores de la hoja, gusanos medidores, gusanos de la cebolla, orugas, moscas blancas, salivazos, chinches harinosas, escamas, trips, psílidos, chinches de la planta, moscas de las frutas, tijeretas, gorgojos.

mildiú polvoroso, roya, fuego bacteriano, manchas foliares

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

USAR EN INTERIORES, AL AIRE LIBRE Y EN INVERNADEROS	PLAGA	ENFERMEDAD
PLANTAS ORNAMENTALES: plantas con flores y arbustos, plantas ornamentales leñosas, rosas, árboles y plantas hogareñas.	hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas cosechadoras, hormigas faraón y hormigas carpinteras), áfidos, escarabajos, ácaros, arañas rojas, chicharritas de la hoja, rosquillas omnívora, minadores de la hoja, gusanos soldado, gusanos medidores, orugas, babosas de la rosa, moscas blancas, salivazos, chinches harinosas, escamas, trips, psílidos, chinches de la planta, chinches de encaje, tijeretas, gorgojos.	mildió polvoroso, roya, fuego bacteriano, antracnosis, manchas de las hojas.
CÉSPEDES	áfidos, ácaros, arañas rojas, chicharritas de la hoja, orugas, escarabajos, salivazos, trips, tijeretas	roya, manchas foliares, fuego bacteriano, mildió polvoroso.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Mantener en temperatura ambiente y proteger de las heladas.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACION DE ENVASES

No reusable. No vuelva a usar o cargar este envase.

Si está vacío:

- Colóquelo en la basura o entréguelo para reciclar de ser posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llame a la agencia local de residuos sólidos o al 1-877-229-3724 para su eliminación apropiada. Nunca coloque el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para los organismos acuáticos incluyendo los peces e invertebrados. No contamine el agua cuando se deshaga del equipo, agua de enjuague o residuos. No aplicar directamente al agua o en sus cercanías. La deriva y el escurrimiento pueden ser perjudiciales para los peces de aguas adyacentes a las áreas tratadas. Ver Indicaciones de Uso para leer más sobre requisitos y precauciones.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Combustible. No use o almacene cerca del calor o a llama expuesta.

Recomendaciones de seguridad para el usuario

- Los usuarios deben lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de comer, beber, consumir goma de mascar, tabaco o usar el baño.
- Los usuarios deben quitarse la ropa inmediatamente si el pesticida se introduce en esta. Luego lavar bien y vestirse con ropa limpia.

PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

- Causa moderada irritación en los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Evitar contacto con la piel o la ropa.
- Lavar bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de ingerir alimentos, beber, mascar goma de mascar, consumir tabaco o ir al baño.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Sacar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.
- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos.
- Retirar las lentes de contacto, si tuviera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un médico o al centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

Cuando llame a un médico, un centro de control de envenenamiento, o una sala de emergencias, tenga a su alcance la etiqueta o el envase del producto. Para mayor información sobre este pesticida, llame al número gratuito 1-877-229-3763 a fin de obtener un tratamiento de emergencia.



**Insect, Disease
& Mite Control** Ready-to-Use

PRECAUTIONARY STATEMENTS (cont'd)

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes. Avoid contact with skin or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

FIRST AID +

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information on this pesticide product, you may call toll free 1-877-229-3763 for emergency medical treatment information.

NOTICE TO BUYER: To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for the purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either expressed or implied.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 67702-15-92564

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (47) = 52251-OR-005
(65) = 92564-TX-1 (57) = 071106-GA-003



Sold under License of W. Neudorff GmbH KG
Natria® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive, Suite 500
Cary, NC 27513

PRESS TO RESEAL

501422806a 17/04/27V1